

# Bioref 24



Acido Ialuronico

+

Sodio Alginato

**STOP!**

Reflusso  
Bruciore  
Tosse  
stizzosa  
Iperacidità  
Pirosi  
Disfonia  
Disfagia



Pratico, Sicuro, Buono,  
Clinicamente testato, Efficace

Nel , quasi  
il **25%** della popolazione  
e in  circa il **26%**  
riferisce sintomi  
imputabili alla  
**MALATTIA da REFLUSSO**

Comunicato stampa SIGE 2024

*I sintomi sono dovuti  
alla risalita di contenuto  
gastrico nell'esofago.*

# Bioref 24




## RAPIDO contro il REFLUSSO



*Riduce rapidamente i sintomi*



BRUCIORE



DOLORE alla  
bocca dello STOMACO



RIGURGITO



## Favorisce i **PROCESSI RIPARATIVI**

- **Riduce** il danno all'**ESOFAGO** e lo **protegge** da ulteriori **INSULTI ACIDI**

- **Riduce** il grado di **INFIAMMAZIONE** e **DEGENERAZIONE** dei tessuti

- Crea una **BARRIERA ANTIREFLUSSO**

- Crea un **FILM** in grado di **RIGENERARE LE MUCOSE**





ASSOCIAZIONE BREVETTATA

ACIDO IALURONICO

MEDIO ALTO PM

15 mg



SODIO ALGINATO

375 mg

effetto  
**RIPARATIVO**  
sul **TESSUTO LESIONATO**


effetto  
**FILMANTE**  
**RIEPITELIZZANTE**

RISPOSTA  
IMMEDIATA

EFFICACIA  
PROLUNGATA

OTTIMA  
PALATABILITÀ

TOLLERABILITÀ  
ELEVATA



effetto  
**BARRIERA**  
**ANTIREFLUSSO**

Il gel spugnoso resta adeso alle mucose del tratto esofageo  
**senza** la presenza di **gomme\***

\* I prodotti contenenti gomme hanno  
un **limite di utilizzo** a 30 giorni.

## VANTAGGI



**Gel filmante** a base di due attivi naturali senza aggiunta di eccipienti:  
**Acido ialuronico + Sodio alginato**



**Efficacia** clinica dimostrata da **studio clinico**



**Miglioramento** significativo della **sintomatologia**



**Miglioramento** morfologico dell'**epitelio esofageo** con riduzione dell'**infiammazione**, **degenerazione** ed aumento dell'**integrità**



**Nessuna interazione** farmacologica



**No** utilizzo di **gomme addensanti**




**Sicuro** in **gravidanza** ed **allattamento**



AZIONE  
**RAPIDA**



EFFETTI  
**COLLATERALI**



SENZA  
**ZUCCHERO**



SENZA  
**GLUTINE**



SENZA  
**LATTOSIO**



A BASSO  
CONTENUTO  
DI **SODIO**



| Contenuti medi   | Per 1 bustina |
|------------------|---------------|
| Sodio alginato   | 375 mg        |
| Acido ialuronico | 15 mg         |

**MODALITÀ D'USO:** si consiglia l'uso di 1 bustina dopo ogni pasto principale o al bisogno o la sera prima di coricarsi. Avere cura di non bere o mangiare dopo l'assunzione del prodotto per almeno 30'.

